

輸血使用可能期間

全血製剤	採血後21日間
赤血球製剤	採血後28日間
血小板製剤	採血後4日間
血漿製剤	採血後1年間

採血基準

採血の種類		全血採血	
1回採血量		200ml	400ml
年齢		16～69歳	男性：17～69歳 女性：18～69歳
		ただし、65～69歳の方については、60歳に達した日から65歳に達した日の前日までの間に採血が行われた方に限る	
体重		男性：45kg以上 女性：40kg以上	50kg以上
最高血圧		90mmHg以上180mmHg未満	
最低血圧		50mmHg以上110mmHg未満	
脈拍		40回/分以上100回/分以下	
体温		37.5℃未満	
血色素量		男性：12.5g/dL以上 女性：12.0g/dL以上	男性：13.0g/dL以上 女性：12.5g/dL以上
採血間隔	前回採血	4週間後の同じ曜日から	
	200ml全血		
	400ml全血	男性：12週間後 女性：16週間後	の同じ曜日から
	血漿成分	2週間後の同じ曜日から	
	血小板成分		
年間総採血量※		200ml・400ml全血を合わせて 男性：1200ml以内 女性：800ml以内	
年間総採血回数※		男性：6回以内 女性：4回以内	男性：3回以内 女性：2回以内

※ 1 年は52週として換算。期間の計算は直近の採血を行った日から起算します。

【共通事項】

次の方からは採血しない。

- ①妊娠していると認められる方、又は過去 6 ヶ月以内に妊娠していたと認められる方
- ②採血により悪化するおそれのある循環器系疾患、血液疾患その他の疾患に罹っていると認められる方
- ③有熱者その他健康状態が不良であると認められる方